



蓝耳病是当前全球公认的最具威胁性的猪病之一，其强传染性让病毒极易在猪群中迅速蔓延，导致猪群健康防线崩塌，生产性能骤降，最终让养猪场承受巨大的经济损失。

在我国，蓝耳病的流行情况较为复杂，几乎全年四季皆可发生，且呈现“点多面广、持续散发”的特点，继发的混合感染往往造成更严重的损失。海大集团基于多年防控实践，总结出一套系统性的控蓝策略，近年来在全国多地实际应用，成效显著。

猪场蓝耳病爆发怎么办 海大“三合一”系统方案三周帮您稳定猪场

Superior Haid Model, New Quality Productivity

发病背景

今年5月初，山东某两点式自繁自养场刚断奶的2500头仔猪出现大面积的咳喘，部分猪只日渐消瘦，病残仔猪不断增多。断奶一个月内，死亡仔猪数达到167头，死亡率高达6.68%。该阶段仔猪母源抗体消退、自身免疫力尚未健全，加上断奶应激及可能存在的饲养管理漏洞，导致群体抗病力大幅下降。养殖户自行用药近半个月仍未见改善，情况十分紧急。

为明确病因，海大迅速组织专家进场开展诊断和评估。

确诊病因

经专家现场诊断，约10%的猪表现出呼吸道症状，猪群的采食量明显降低、精神沉郁。通过现场对死猪诊断和解剖猪只发现肺部肉质化，充血水肿，肺部、腹股沟淋巴结肿大等情况，初步怀疑蓝耳病。

随后采样进行实验室分析，检测结果显示，猪群蓝耳抗原阳性率85.71%，ct数值24.8，表明病毒载量极高，确诊为蓝耳病爆发，并呈现大面积感染的态势。此外，结合猪副嗜杆菌，猪附红体

抗原阳性结果，说明此猪场为蓝耳-副猪-猪附红体混合感染，极大加剧了病情复杂性和死亡率，防控形势严峻。

控蓝方案

1、药物治疗，快速稳定

蓝特利2kg+海支美2kg+海弗欣1kg，拌料1吨。该方案以海大抗蓝产品蓝特利为核心，海支美+海弗欣控制继发感染。全群选择喂湿拌料，连续饲喂2周。通过中西药联合压制，确保猪体内病毒血症快速稳定以及控制继发感染，尽快缓解临床症状、降低猪只死亡率。

针对消瘦、不吃料的猪喂粥料，水料比5:1，在上述药物基础上再添加维生素C（500g/吨料）和优菌宝（10kg/吨料），改善猪只营养，提高抵抗力。

2、生物安全，阻断传播

蓝耳病毒通过病猪与健康猪的直接接触，以及饮水、器具间接传播。严格消毒可有效切断此途径。该猪场正处于蓝耳扩散时期，为了确保治疗效果，对本场的生物安全措施进行了改进：

物品管理：可浸泡工具需经过卫宝（1:200浓度稀释）浸泡≥20分钟，不可浸泡物品（如手机）酒精擦拭消毒；

猪舍消毒：每天对猪舍带猪消毒一次，用卫欣1:1000稀释，即1片兑水1-2kg；

周围区域：每周一次对生活区、生产区等进行全面消毒，使用20%戊二醛1:2000稀释进行喷洒消毒；

人员进出：穿戴一次性防护服，每换一个栏舍雨靴浸泡2%烧碱溶液进行消毒。脚踏消毒槽至少深15厘米，内置2%~3%的烧碱水，消毒液深度大于5厘米。3~4天更换1次。

3、生产管理，防控增效

清理圈舍：每隔三天对圈内粪便进行清理，降低栋舍内的氨气浓度，改善空气质量；

温控管理：白天温度控制在23-28℃，夜间可关闭部分排风扇，避免昼夜温差过大；

定时巡栏：每天两次巡栏，上午和下午各一次，及时挑出猪舍内精神状态不好、不吃料或者症状明显的猪只，轻症的注射治疗，症状严重的转入病猪栏由专人护理。

4、情况跟踪，恢复良好

经过3周系统的治疗，猪群咳喘症状基本消失，精神状态明显好转，死亡情况得到有效控制，无新增病例，整体趋于稳定。

采食恢复正常：在治疗期间猪群采食量慢慢恢复正常并且与标准采食量几乎相接近，说明处理方案有效的维持了猪群采食量，减少了疾病导致的采食量下降；

猪群恢复情况：病猪数量整体呈现持续下降的趋势。原病猪数192头，治疗期间新增10头，现存31头，死亡10头，恢复数量171头，恢复率达到了85%。这表明在整个治疗期间，病猪的发病情况得到了有效的控制并且对于已发病的猪治疗效果十分明显；

客户反馈：猪场老板高度认可了海大控蓝方案和驻场服务，并主动向周边养殖户推荐，海大控蓝方案正逐渐在当地推广落地。

面对来势汹汹的蓝耳病，广大养殖户朋友们不必过度惊慌，应对的关键在于方法得当。单靠盲目用药或“头痛医头、脚痛医脚”的传统方式已难以应对，应采取更为科学、系统、全面的综合防控策略。

海大推出的“药物+生物安全+管理”系统方案，可迅速压制临床症状、降低猪群病毒载量使猪群快速稳定，更能通过阻断传播、提升管理，帮助猪场筑牢生物安全防线，从而实现长期稳定，最大程度地将损失降至最低。

（畜禽动保大区供稿）